

SELBST VERSTÄNDLICH IMPFEN

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den
Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Der Impfkalender ist nun in den Sprachen Albanisch, Arabisch,
Dari, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Kroatisch, Kurdisch,
Polnisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch,
Urdu und Vietnamesisch kostenlos als Download verfügbar.



IMPFKALENDER

Empfehlungen der Ständigen
Impfkommision (STIKO), 2014.
www.stiko.de

ALTER	(in Wochen)	Säuglinge		(in Monaten)		Kleinkinder		Kinder			(in Jahren)		Jugendliche	Erwachsene	
	6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–17	ab 18	ab 60		
IMPfung			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1					
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A f	(alle 10 Jahre, ggf. N)		
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A f	(alle 10 Jahre, ggf. N)		
Keuchhusten Pertussis		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A f	(ggf. N)		
Kinderlähmung Poliomyelitis		G1	G2 a	G3	G4	N				A1		ggf. N			
Hepatitis B		G1	G2 a	G3	G4	N									
Hib Haemophilus influenzae Typ b		G1	G2 a	G3	G4	N									
Pneumokokken		G1	G2	G3	G4	N								S c	
Rotaviren	G1 b	G2	(G3)												
Meningokokken Serogruppe C					G1 (ab 12 Monaten)		N								
Masern					G1	G2	N							S d	
Mumps Röteln					G1	G2	N								
Windpocken Varizellen					G1	G2	N								
Grippe Influenza														S (jährlich)	
HPV Humane Papillomviren										G1 e	G2 e	N e			

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- S** STANDARDIMPFUNG
- A** AUFRISCHIMPFUNG
- N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfsreihe)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- b** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c** Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.

- d** Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- e** Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff), Anzahl der Impfstoffdosen siehe Fachinformation!
- f** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

ROBERT KOCH INSTITUT



In weiteren 16 Sprachen unter www.rki.de/impfkalender erhältlich!

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages